

Příloha č. 7 **Charakter fauny bezobratlých**  
(viz. soubor bezob.pdf)

Charakter fauny bezobratlých odpovídá vegetačním formacím a soupis druhů zahrnuje 26 druhů bezobratlých živočichů. Nález drobného plže jantarky (*Succinea* sp.) v lesíku indikuje trvale zamokřený, kyselý biotop. V letním aspektu dominantní kopřivu jako nejhojnější druhy doprovází toulice kopřivová (*Orthezia urticae*) a motýl zubonosec kopřivový (*Syllepta ruralis*). Dobře zachovalý stav ekosystémů potvrzuje výskyt vzácné babočky osikové (*Nymphalis antiopa*). Z ostatních druhů, typických pro vlhké louky a lesní okraje jsou to kobyłka cvrčivá (*Tettigonia cantans*), okáč poháňkový (*Coenonympha pamphilus*), modrásek jehlicový (*Polyommatus icarus*), přástevník jitrocelový (*Parasenia plantaginis*), střevlíček obecný (*Pterostichus vulgaris*) aj.

České jméno	Latinské jméno
babočka osiková	<i>Nymphalis antiopa</i>
babočka kopřivová	<i>Aglais urticae</i>
babočka paví oko	<i>Inachis io</i>
bělásek řepkový	<i>Pieris napi</i>
bělásek zelný	<i>Pieris brassicae</i>
jantarka	<i>Succinea</i> sp.
kobyłka	<i>Pholidoptera cinerea</i>
kobyłka cvrčivá	<i>Tettigonia cantans</i>
kovolesklec gamma	<i>Autographa gamma</i>
kropenatec jetelový	<i>Cliasmia clathrata</i>
kvapník	<i>Amara aurica</i>
modrásek jehlicový	<i>Polyommatus icarus</i>
okáč poháňkový	<i>Coenonympha pamphilus</i>
přástevník jitrocelový	<i>Parasenia plantaginis</i>
střevlíček obecný	<i>Pterostichus vulgaris</i>
střevlíček	<i>Abas parallelipedus</i>
střevlík fialový	<i>Carabus violaceus</i>
střevlík zahradní	<i>Carabus hortensis</i>
střevlík zrnitý	<i>Carabus granulatus</i>
toulice kopřivová	<i>Orthezia urticae</i>
travařík	<i>Crambus tristellus</i>
vřetenuška tužebníková	<i>Zyganea filipendulea</i>
zobonosec kopřivový	<i>Hypena proboscidalis</i>
zubonosec kopřivový	<i>Syllepta ruralis</i>
žluťásek řešetlákový	<i>Gonepteryx shamni</i>